

**Activité physique :** Elle est possible et souhaitable en fonction de vos possibilités.

**Alimentation :** Aucun aliment n'est formellement contre-indiqué. Si vous avez des difficultés à manger, plutôt que de faire 3 gros repas par jours, privilégiez les collations ou le grignotage.

**Tabac :** Il peut favoriser la survenue des aphtes. Alcool : La consommation n'est pas interdite pendant l'intercure à condition qu'elle soit avec modération.

**Exposition solaire :** Il faut se protéger surtout en cas d'ensoleillement important: par le port de chapeaux et de vêtements « couvrants » ou utilisation de crèmes protectrices d'indice solaire 50 +

**Conduite automobile :** L'acuité visuelle et la concentration peuvent être altérées par la chimiothérapie et les médicaments qui l'accompagnent. Évitez de conduire pendant la cure.

**Fièvre :** **Prenez votre température devant toute sensation de fièvre ou de froid inexplicée. En cas de fièvre ou de frissons : faites une prise de sang comme cela vous a été prescrit et informez-en un médecin le jour même.**

**Chambre implantable :** Surveillez régulièrement la peau en regard de la chambre et informez l'équipe médicale en cas de plaie, de gonflement ou de douleur.


**Vaccinations :** la plupart des vaccinations et rappels sont autorisés, voire recommandés pendant votre chimiothérapie (notamment la grippe). Les vaccins dits « vivants » sont contre-indiqués (type fièvre jaune,...)

**Grossesse :** Une contraception efficace doit impérativement être utilisée pendant toute la durée de votre chimiothérapie. Prévenez rapidement votre médecin en cas de survenue d'une grossesse

**Sexualité :** La fatigue, l'anxiété et la perturbation de l'équilibre hormonal entraînent une baisse importante de l'intérêt et du désir sexuel. Des symptômes comme la sécheresse vaginale, la douleur pendant le rapport sexuel ou des troubles de l'érection, peuvent survenir. N'hésitez pas à en parler à l'équipe médicale.

**Interactions médicamenteuses :** Informez votre médecin traitant de votre protocole de chimiothérapie. Informez l'équipe médicale de tout nouveau traitement mis en place par votre médecin traitant. Ne prenez pas, sans avis médical préalable, de médicaments disponibles librement et sans ordonnance. **Certaines plantes et huiles essentielles peuvent aussi interagir avec votre traitement.**

- Il se déroule sur 3 jours
- Il comporte l'administration de deux médicaments de chimiothérapie : le cisplatine et l'étoposide ou VP16
- Il est associé à des médicaments contre les nausées et vomissements et une hydratation



Fréquence	Description	Prévention	Traitement
+	<b>Nausées, Vomissements</b>	Manger lentement, fractionner les repas. Médicaments préventifs : Ondansetron, Aprepitant, Cortoïdes.	Médicaments : métoclopramide, Métopimazine Si vomissements : prendre les traitements sous forme lyoc ou en suppositoires
	<b>Toxicité hématologique :</b> Baisse de l'hémoglobine (anémie), des globules blancs (GB), des plaquettes	Surveillance par prises de sang Lavez-vous bien les mains Prescription dans certains cas d'injections à faire à la maison : G-CSF pour éviter la baisse des globules blancs, après chaque cure EPO en cas d'anémie	Votre traitement peut être reporté d'une semaine en cas de nombre de polynucléaires neutrophiles (PNN) ou de plaquettes insuffisant En cas de fièvre et de baisse importante des PNN, une hospitalisation peut être nécessaire En cas d'anémie sévère ou de baisse importante des plaquettes, une transfusion peut être nécessaire
	<b>Alopécie :</b> perte des cheveux	Casque réfrigérant pendant la perfusion Eviter l'utilisation de produits chimiques sur les cheveux (ammoniaque,...)	Perruque ou prothèse capillaire Foulards, chapeaux,...
	<b>Aphtes, mucite</b>	Hygiène buccale : se brosser les dents, faire des bains de bouche aux bicarbonates après les repas Eviter le tabac, l'alcool	Bains de bouche spécifiques (anti-fongiques, aspirine) Glaçons
	<b>Toxicité rénale :</b> Augmentation de la créatinine, oedèmes, HTA	Hyperhydratation avant et après perfusion de cisplatine par perfusion et/ou par voie orale : boire en grande quantité	Arrêt du cisplatine Hydratation
	<b>Neuropathie :</b> Diminution de la sensibilité des mains et des pieds		En cas de symptômes : le signaler au médecin Arrêt du cisplatine
	<b>Toxicité auditive :</b> Baisse de l'audition, acouphènes		En cas de symptômes : le signaler au médecin Arrêt du cisplatine